Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17412014-1
Сатып алудың атауы:	Дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81408305-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ибупрофен
Лоттың сипаттауы:	таблеткалар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ибупрофен таблеткалары, 200 мг, №50
Саны, көлемі:	36
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Республика, 94
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының 12-бабы 5-тармағының 4) және 5) тармақшаларына сәйкес жүргізіледі. Ибупрофен таб. 200 мг №50 Шығарылу түрі: Таблеткалар. Препарат түрі: Дәрілік препарат. Белсенді зат: Ибупрофен. Тағайындалуы: Бұлшықет ауыруы, буын ауыруы, бас ауыруы, тіс ауыруы, етеккір кезіндегі ауыру. Әсер ететін мүшелер мен жүйелер: Тірек-қимыл жүйесі, жүйке жүйесі. Құрамы: Әр таблетка құрамында: белсенді зат: ибупрофен – 200 мг; қосымша заттар: картоп крахмалы, магний стеараты, кальций стеараты, повидон, опадрай (құрамында жартылай гидролизденген поливинил спирті, тальк, макрогол 3350, лецитин, титан диоксиді (Е 171)). Қолдану тәсілі және дозалары: Ішке қабылдауға арналған. Тамақтану кезінде немесе тамақтан кейін, сумен ішу ұсынылады. Таблеткаларды бүтіндей жұту керек, шайнауға, сындыруға немесе ұсақтауға болмайды (тамақ пен жұтқыншақтың тітіркенуін болдырмау үшін). Жағымсыз әсерлерді ең төмен тиімді дозаны қысқа уақыт қолдану арқылы азайтуға болады. Ересектер: Ұсынылатын тәуліктік доза – 1200–1800 мг, бірнеше рет қабылдау арқылы. Кейбір науқастарға тәулігіне 600–1200 мг жеткілікті болуы мүмкін. Ауыр немесе жедел жағдайларда тәуліктік дозаны 2400 мг-нан асырмай, бірнеше рет қабылдауға болады. Балалар: Тәуліктік доза – дене салмағына 20 мг/кг, бірнеше рет қабылдау арқылы. Ювенильді ревматоидты артритте доза 40 мг/кг дейін арттырылуы мүмкін. Дене салмағы 7 кгнан төмен балаларға ұсынылмайды. Егде жастағы адамдар: Жағымсыз әсерлердің даму қаупі жоғары. Қажет болған жағдайда ең төмен тиімді дозаны қысқа мерзімге қолдану керек. Асқазан-ішек жолынан қан кетуді тұрақты бақылау қажет. Бүйрек немесе бауыр жеткіліксіздігі болған жағдайда доза жеке анықталады. Қолдану көрсетілімдері: Ибупрофен ревматоидты артритті (соның ішінде ювенильді ревматоидты артрит немесе Стилл ауруы), анкилоздаушы спондилитті, остеоартрозды және басқа да серонегативті артропатияларды емдеуде ауыруды басатын және қабынуға қарсы дәрі ретінде қолданылады. Сондай-ақ: иықтың «қатып қалуы» (буын қабының қабынуы), бурсит, тендинит, тендовагинит, бел ауыруы; жұмсақ тіндердің зақымдануы (байламдардың созылуы); дисменорея, тіс және операциядан кейінгі ауыру; бас ауыруы, соның ішінде мигрень кезінде симптоматикалық ем ретінде қолданылады. Қарсы көрсетілімдері: Препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық; Бұрын ибупрофен, аспирин немесе басқа ҚҚСП (НПВС) қабылдағанда аллергиялық реакциялар (астма, есекжем, Квинке ісінуі, ринит); Асқазан-ішектен қан кету немесе ойық жара (анамнезде); Қайталамалы ойық жара ауруы; Қан кетуге бейімділік; Ауыр жүрек, бауыр немесе бүйрек жеткіліксіздігі; Жүктіліктің соңғы триместрі. Жанама әсерлері: Қызыл, іш ауыруы, жүрек айну, құсу, диарея, метеоризм, тәбеттің төмендеуі, асқазан-ішек жолынан қан кету, бас ауыруы, бас айналу, ұйқысыздық немесе ұйқышылдық, депрессия, құлақтағы шу, көру және есту бұзылыстары, аллергиялық тері реакциялары, Квинке ісінуі, бронхоспазм, жүрек жеткіліксіздігі,

	тахикардия, артериялық қысымның жоғарылауы, бүйрек функциясының бұзылуы, анемия, тромбоцитопения және т.б. Фармакологиялық әсері: Ибупрофен – стероидты емес қабынуға қарсы препарат (ҚҚСП). Қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын әсер көрсетеді. Қабыну медиаторларының түзілуін тежейді, циклооксигеназаны тежеп, простагландиндердің биосинтезін блоктайды. Артық дозалану: Белгілері: іш ауыруы, жүрек айну, құсу, бас айналу, ұйқышылдық, құрысу, аритмия, жедел бүйрек жеткіліксіздігі. Емі: препаратты тоқтату, симптоматикалық және демеуші ем. Арнайы антидоты жоқ. Асқазанды шаю препаратты қабылдағаннан кейін 1 сағат ішінде тиімді. Айрықша нұсқаулар: Асқазан-ішек жолы, бауыр, бүйрек, жүрекқантамыр жүйесі аурулары бар науқастарға сақтықпен қолдану; Ұзақ қолданғанда қан көрсеткіштері мен бауыр, бүйрек функциясын бақылау қажет; Емдеу кезеңінде алкоголь қолдануға болмайды; Көлік құралдарын басқару және зейін қоюды талап ететін жұмыстардан бас тарту керек. Дәрілермен өзара әрекеттесуі: Ибупрофен метотрексат, литий, дигоксин концентрациясын арттыруы мүмкін; диуретиктер мен гипотензивті дәрілердің әсерін төмендетеді; антикоагулянттармен бірге қолданғанда қан кету қаупін арттырады және т.б. Сақтау шарттары: Жарықтан және ылғалдан қорғалған жерде, 25°С-тан аспайтын температурада сақтау. Дозасы: 200 мг. Өлшем бірлігі: Дана.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17412014-1
Наименование закупки:	Государственные закупки медикаментов и медицинских изделий
Номер лота:	№ 81408305-ЗЦП1
Наименование лота:	Ибупрофен
Описание лота:	таблетки
Дополнительное описание лота:	Ибупрофен таб. 200 мг №50
Количество:	36
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы Республика, 94
Срок поставки:	Со дня получения заявки от Заказчика, в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Данная государственная закупка проводится в соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 5 статьи 12 Закона РК "О государственных закупках". Ибупрофен таб. 200 мг №50. Форма выпуска: Таблетки; Тип препарата: Лекарственный препарат; Активные вещества: Ибупрофен. Назначение: Боль в мышцах, Боль в суставах, Головная боль, Зубная боль, Менструальные боли. Органы и системы: Опорно-двигательная система, Нервная система. Состав: Каждая таблетка содержит:действующего вещества: ибупрофена – 200 мг, вспомогательные вещества: крахмал картофельный, магния стеарат, кальция стеарат, повидон, опадрай ?? (содержит спирт поливиниловый, частично гидролизованный, тальк, макрогол 3350, лецитин, титана диоксид (Е 171)). Способ применения и дозы: Для перорального введения. Желательно применение во время или после еды, запивая водой. Таблетки следует проглатывать целиком, не жевать, не разламывать, не дробить во избежание дискомфорта и раздражения горла.Побочные эффекты могут быть минимизированы при применении самой низкой эффективной дозы в течение короткого времени.Взрослые: рекомендуемая дозировка ибупрофена составляет 1200-1800 мг в день, в несколько приемов. Некоторые пациенты могут принимать 600-1200 мг ибупрофена в день. При тяжелых или острых состояниях можно увеличить дозировку при условии, что общая суточная доза не превышает 2400 мг, в несколько приемов. Дети: суточная доза ибупрофена составляет 20 мг/кг массы тела, в несколько приемов. При ювениальном ревматоидном артрите доза может быть увеличена до 40 мг/кг массы тела, в несколько приемов. Не рекомендуется детям с массой тела менее 7 кг. Пожилые люди: пожилые люди подвергаются повышенному риску возникновения побочных эффектов. В случае необходимости применения нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), ибупрофен должен применяться в низкой эффективной дозе в течение короткого времени. Пациент должен регулярно проверять отсутствие желудочно-кишечных кровотечений во время приема НПВС. При наличии почечной или печеночной недостаточности, дозировка должна быть определена индивидуально. Показания: Ибупрофен применяется как обезболивающее и противовоспалительное средство при лечении ревматоидного артрита (в том числе ювенильного ревматоидного артрита или болезни Стилла), анкилозирующего спондилита, остеоартроза и других неревматоидных (серонегативных) артропатий. Ибупрофен показан: для лечения неревматических воспалительных процессов периартикулярных тканей, таких как «замороженное» плечо (воспаление оболочки сустава), бурсит, тендинит, тендовагинит и боли в пояснице. Ибупрофен также может быть использован для облегчения болевого синдрома при повреждении мягких тканей, таких как растяжения связок. Ибупрофен также показан в качестве обезболивающего средства для купирования слабого и умеренного болевого синдрома при таких состояниях, как дисменорея, зубная или послеоперационная боль, для симптоматического облегчения головной боли, в том числе мигрени. Противопоказания: Ибупрофен противопоказан пациентам

	с повышенной чувствительностью к активному или вспомогательным веществам препарата. Ибупрофен не должен применяться больными, у которых ранее были отмечены реакции гиперчувствительности (например, астма, крапивница, отек Квинке или ринит) после приема ибупрофена, аспирина или других НПВС. Ибупрофен также противопоказан пациентам с желудочно-кишечным кровотечением или перфорацией в анамнезе, связанной с предыдущей терапией ибупрофеном. Ибупрофен не должен применяться больными с рецидивирующей язвенной болезнью или желудочно-кишечным кровотечением (два или более эпизода доказанного изъязвления или кровотечения). Ибупрофен не следует назначать пациентам при состояниях, сопровождающихся повышенной склонностью к кровотечениям. Ибупрофен противопоказан пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью, печеночной и почечной недостаточностью. Ибупрофен противопоказан во время последнего триместра беременности. Побочные действия: Изжога, боли в животе, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, анорексия, НПВС-гастропатия, желудочно-кишечные кровотечения, головная боль, головокружение, бессонница или сонливость, возбуждение, депрессия, шум в ушах, нарушения остроты слуха, зрения (нарушение цветового зрения, скотома, амблиопия), кожные аллергические реакции, крапивница, ангионевротический отек, мультиформная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), асептический менингит, бронхоспазм, сердечная недостаточность, тахикардия, повышение АД, отечный синдром, нарушение функции почек, аллергический нефрит, анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения, усиление потоотделения. Фармакологическое действие: Препарат Ибупрофен относится к нестероидным противовоспалительным средствам. Ибупрофен оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. Подавляет продукцию медиаторов воспаления. Ингибирует циклооксигеназу и блокирует биосинтез простагландинов. Противовоспалительное действие обусловлено нормализацией повышенной проницаемости сосудов, улучшением микроциркуляции, уменьшением либерации гистамина, брадикинина и других медиаторов воспаления, торможением образования АТФ, что обусловливает снижение энергообеспечения воспалительного процесса. Анальгезирующее действие ибупрофена связано со снижением интенсивности воспаления, уменьшением выработки и ослаблением альгогенности брадикинина. Передозировка: Симптомы: типичной клинической картины при передозировке ибупрофена не развивается. Возможно появление болей в животе, тошноты, рвоты, головокружения, заторможенности, сонливости, депрессии, головной боли, гипотонии, судорог, нарушения сердечного ритма, острой почечной недостаточности, угнетения дыхания.Лечение: меры помощи включают отмену препарата, поддерживающую и симптоматическую терапию, направленную на устранение возникших нарушений, коррекцию кислотно-основного состояния. Возможно проведение форсированного диуреза с одновременным назначением щелочного питья, активированного угля, для

	уменьшения реабсорбции ибупрофена. Специфического антидота не существует. Промывание желудка эффективно только в течение часа после приема препарата. Особые указания: Лица с патологией ЖКТ. Во время применения ибупрофена необходимо тщательное медицинское наблюдение за пациентами, у которых имеются жалобы со стороны органов ЖКТ, язвенное поражение ЖКТ в анамнезе, а также неспецифический язвенный колит или болезнь Крона. На фоне применения ибупрофена у этой группы пациентов может возникнуть (впервые или повторно) желудочно-кишечное кровотечение или изъязвление/перфорация ЖКТ, которые могут не сопровождаться симптомами-предвестниками. Во всех таких случаях препарат должен быть отменен. Лица с патологией системы крови. Ибупрофен временно ингибирует агрегацию тромбоцитов, поэтому у пациентов с нарушениями гемостаза необходим тщательный контроль соответствующих лабораторных показателей. При длительном применении ибупрофена показан систематический контроль периферической крови. Лица с заболеваниями печени. Во время применения ибупрофена возможно транзиторное повышение активности печеночных ферментов. При длительной терапии ибупрофеном в качестве меры предосторожности показан лабораторный контроль функции печени. Если нарушения со стороны функциональных показателей сохраняются или усиливаются, а также, если возникают клинические проявления иных поражений печени, ибупрофен следует отменить. Следует помнить, что гепатит на фоне применения ибупрофена может возникнуть без продромальных проявлений. Лица с патологией сердечно-сосудистой системы. Поскольку простагландины играют важную роль в поддержании нормального почечного кровтока, особая осторожность требуется при использовании ибупрофена у пациентов страдающих нарушениями функции почек и хронической застойной сердечной недостаточностью, у лиц, получающих диуретические средства, а также у больных со значительным уменьшением объема циркулирующей плазмы (например, в период до и после массивных хирургических вмешательств). Во всех этих случаях рекомендуется в качестве меры предосторожности контроль функции почек. Прекращение применения препарата обычно приводит к восстановлению функции почек до исходного уровня. Влияние на лабораторные показатели. При необходимости определения 17-кетостероидов в моче, прием ибупрофена должен быть прекращен за 48 ч до проведения анализа. В период лечения не рекомендуется прием этанола. Вишневый и смородиновый сок, сахарный сироп увеличивают скорость всасывания ибупрофена. Для снижения риска развития нежелательных явлений со стороны ЖКТ следует использовать минимальную эффективную дозу минимально возможным коротким курсом. Влияние на способность управлять транспортом и механизмами В период применения ибупрофена необходимо воздерживаться от всех видов деятельности, требующих повышенного внимания, быстрой психической и двигательной реакции. Взаимодействие: Ибупрофен может повышать концентрации метотрексата, лития и дигоксина в плазме при одновременном применении с этими

	препаратами. Ибупрофен, как и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) может уменьшать эффект диуретиков, блокаторов кальциевых каналов, ингибиторов АПФ и других гипотензивных препаратов, что связано с нарушением синтеза простагландинов в почках. Одновременное применение с калийсберегающими диуретиками может привести к повышению уровня калия в крови (в случае необходимости такого сочетания лекарственных средств следует мониторировать уровень калия в плазме). Имеются сообщения об увеличении риска кровотечения в случае совместного применения ибупрофена и антикоагулянтов, фибринолитических препаратов. При совместном применении с антидепрессантами, барбитуратами, зиксорином, рифампицином, фенилбутазоном, фенитоином увеличивается риск развития тяжелых интоксикаций за счет повышения продукции гидроксилированных активных метаболитов ибупрофена. Ибупрофен усиливает сахаропонижающую эффективность пероральны гипогликемизирующих средств, что требует коррекции дозы этих препаратов на фоне применения ибупрофена. Глюкокортикоидные и минералкортикоидные гормоны, колхицин усиливают противовоспалительное действие ибупрофена и повышают риск развития поражения желудочно-кишечного тракта. При совместном применении с цефамандолом, цефоперазоном, цефотетаном, вальпроевой кислотой и пликамицином возрастает риск развития гипопротромбинмии. Циклоспорин и препараты золота усиливают нефротоксическое действие ибупрофена. Ибупрофен усиливает нежелательное действие эстрогенов при совместном применении. Ибупрофен ослабляет эффективность урикозурического действия противоподагрических средств. Колестирамин замедляет абсорбцию ибупрофена. Кофеин усиливает анальгетический эффект ибупрофена. Ибупрофен повышает токсичность этанола. При совместном применении ацетилсалициловая кислота ослабляет эффект ибупрофена и увеличивает его токсичность, это связано с вытеснением ибупрофена из связи с белками и его метаболизмом с образованием токсичных гидроксилированных метаболитов. Условия хранения: В защищённом от света и влаги месте, при температуре не выше 25С. Дозировка: 200 мг. Единица измерения: Штука.