Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17607607-1
Сатып алудың атауы:	Медицинаға арналған өнімдер мен дәрі-дәрмектер (АҚИ зертхана (Бюджет))
Лоттың нөмірі:	№ 83262110-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Нәрлендіру ортасы
Лоттың сипаттауы:	микроағзаларды егуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	PAL ортасы Бактериологиялық зерттеуге арналған реагенттер жинағы «Листерияны оқшаулауға арналған қоректік агар» (1 банка 250 г негіз + 5 SD бөтелке)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе көшесі 47/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде. Өтінімде қажетті саны көрсетіледі. Жеткізу мерзімі өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сыртқы түрі ПАЛ-ашық сары түсті ұсақ ұнтақ. SD-қызғылт түсті ұсақ ұнтақ PAL-ашық сары түсті ұсақ ұнтақ. SDқызғылт түсті ұсақ ұнтақ Ерігіштігі белгілі бір ПАЛ сериясын дайындау үшін қажетті мөлшердегі Препарат қайнатылған және 3 минут араластырылған кезде 1 литр тазартылған суда толығымен еруі керек. ДМ 1 мин араластыру кезінде 5 мл дистилденген суда еруі керек. ақ тұнбаның болуына жол беріледі препарат белгілі бір ПАЛ сериясын дайындау үшін қажетті мөлшерде, қайнату және 3 мин араластыру кезінде 1 литр дистилденген суда толығымен ериді. ДМ 1 мин араластыру кезінде 5 мл тазартылған суда ериді. Ерітінділердің мөлдірлігі мен түсі ерітінді қайнатылғаннан, сүзілгеннен және зарарсыздандырылғаннан кейін мөлдір ашық қоңыр түсті болуы керек. Кішкене опалесценцияға жол беріледі. ДМ ерітіндісі мөлдір қызғылт сары түсті болуы керек. Ерітінді мөлдір ашық қоңыр түсті. SD ерітіндісі мөлдір қызғылт сары түсті. pH 6,7-ден 7,1 6,9-ға дейін Амин азоты, % 1,8-ден 2,4 2,4-ке дейін Хлоридтер (натрий хлоридіне есептегенде), % 35,0-ден 45,0 45,0-ге дейін Кептіру кезінде массаның жоғалуы, % 7,0 2,7 аспайды Желе ортасының беріктігі, г 370-тен 500-ге дейін 370 Ерекше белсенділік Селективті қоспалары бар қоректік орта Барлық себілген Петри табақтарында Listeria monocytogenes 766 және Listeria ivanovi сынақ штаммдарының өсуін 0,1 мл сұйылтылған микробтық суспензияны себу кезінде (37±1)° С температурада 48 сағат инкубациядан кешіктірмей қамтамасыз етуі керек 10 -6 (шамамен 100 м.к.). Listeria monocytogenes 766 колониялары кішкентай, дөңгелек, сұрсары түсті, диаметрі 0,4-1,2 мм, колониялардың айналасында қара аймақ пайда болады. Listeria ivanovi колониялары кішкентай, дөңгелек сұр-сары түсті, диаметрі 0,2-1,0 мм, колониялардың айналасында қара аймақ пайда болады. ТУ талаптарына сәйкес келеді Ингибиторлық қасиеттері селективті қоспалары бар қоректік орта 10 -4 (10000 м. к.) сұйылтудан 0,1 мл микробтық суспензия себу кезінде барлық егілген Петри табақтарында Escherichia coli ATS 25922, Proteus vulgaris НХ 19222 және Staphylococcus aureus Wood-46 сынақ штамдарының өсуін толығымен тежеуі керек. 48 сағ температурада инкубация (37±1) ° С ТУ талаптарына сәйкес келеді

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17607607-1
Наименование закупки:	Медикаменты и средства медицинского назначения (ООИ лаборатория (Бюджет))
Номер лота:	№ 83262110-ЗЦП1
Наименование лота:	Среда питательная
Описание лота:	для культивирования микроорганизмов
Дополнительное описание лота:	Среда ПАЛ Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный агар для выделения листерий» (1 банка по 250 г основы +5 фл. СД)
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана улица Актюбинская 47/1
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года. В заявке указывается необходимое количество. Срок поставки 15 календарных дней со дня подачи заявки.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Внешний вид ПАЛ – мелкодисперсный порошок светложелтого цвета. СД - мелкодисперсный порошок розового цвета ПАЛ – мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. СД - мелкодисперсный порошок розового цвета Растворимость Препарат в количестве, необходимом для приготовления конкретной серии ПАЛ, должен полностью растворяться в 1 л дистиллированной воды при кипячении и перемешивании в течение 3 мин. СД должна растворяться в 5 мл дистиллированной воды при перемешивании в течение 1 мин. Допускается наличие осадка белого цвета Препарат в количестве, необходимом для приготовления конкретной серии ПАЛ, полностью растворяться в 1 л дистиллированной воды при кипячении и перемешивании в течение 3 мин. СД растворяться в 5 мл дистиллированной воды при перемешивании в течение 1 мин. Прозрачность и цветность растворов Раствор ПАЛ после кипячения, фильтрации и стерилизации должен быть прозрачным светло-коричневого цвета. Допускается небольшая опалесценция. Раствор СД должен быть прозрачным оранжевого цвета. Раствор ПАЛ прозрачный светлокоричневого цвета. Раствор СД прозрачный оранжевого цвета. pH От 6,7 до 7,1 6,9 Аминный азот, % От 1,8 до 2,4 2,4 Хлориды (в пересчете на натрия хлорид), % От 35,0 до 45,0 45,0 Потеря в массе при высушивании, % Не более 7,0 2,7 Прочность студня среды, г От 370 до 500 370 Специфическая активность Питательная среда с селективными добавками должна обеспечивать на всех засеянных чашках Петри рост тест-штаммов Listeria monocytogenes 766 и Listeria ivanovi не позднее 48 ч инкубации при температуре (37±1)° С при посеве 0,1 мл микробной взвеси из разведении 10 -6 (около 100 м.к.). Колонии Listeria monocytogenes 766 – мелкие, круглые, серо-желтого цвета, диаметром 0,4-1,2 мм с образованием вокруг колоний черной зоны. Колонии Listeria ivanovi – мелкие, круглые серо-желтого цвета, диаметром 0,2-1,0 мм с образованием вокруг колоний черной зоны. Соответствуют требованиям ТУ Ингибирующие свойства Питательная среда с селективными добавками должна полностью подавлять рост тест-штаммов Escherichia coli ATCC 25922, Proteus vulgaris HX 19222 и Staphylococcus aureus Wood – 46 на всех засеянных чашках Петри при посеве по 0,1 мл микробной взвеси из разведения 10 -4 (10000 м.к.) через 48 ч инкубации при температуре (37±1)° С Соответствуют требованиям ТУ