Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18018603-1
Сатып алудың атауы:	2026 жылға арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88764703-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Дезинфекциялау құралы
Лоттың сипаттауы:	дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы негізінде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дезинфекциялаушы құрал. Бұл құрал салмағы 3,14-тен кем емес және 3,5 грамнан аспайтын көпіршікті қаптамадағы таблеткалар. еріту кезінде кем дегенде 1,4 және 1,64 гр артық емес бөлетіндер. белсенді хлор. Құрал құрамында белсенді зат ретінде дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (Na-ДХИЦК тұзы) кемінде 84% мөлшерінде болады. Бір таблетканың ыдырауы кемінде 3,5 минут және 6,5 минуттан аспайды. Жұмыс ерітінділерінің жарамдылық мерзімі кемінде 6 тәулік. Асқазанға енгізген кезде құрал орташа қауіпті заттардың 3-ші класына, теріге қолданған кезде – қауіпті емес заттардың 4-ші класына жатады. Препарат грам-теріс және грам-позитивті бактерияларға (туберкулез микобактерияларын қоса алғанда), вирустарға (аденовирустарды, тұмау, парагрипп вирустарын және жіті респираторлық инфекциялардың басқа да қоздырғыштарын қоса алғанда, энтеровирустар, ротавирустар, Полиомиелит вирусы, энтеральді, парентеральді гепатиттер, герпес, ЖРВИ, "құс" вирустарына қарсы микробқа қарсы әсері бар тұмау, "шошқа" тұмауы, АИТВ және т. б.) және Кандида мен дерматофит тұқымдас саңырауқұлақтар; құрал аса қауіпті инфекциялардың қоздырғыштарына (оба, тырысқақ, туляремия, легионеллез) қатысты тиімді; құрал спороцидтік белсенділікке ие, оның ішінде сібір жарасы қоздырғыштарының спораларына қатысты; құрал референттік штаммға - Mycobacterium tuberculosis humanus h37rv режиміне ие, ол сынақтарды құжатпен жүргізуді растайды. Хлор таблеткаларын герметикалық тығыздалған пленкасы бар пластикалық банкаға салу керек, бұл хлордың улы иісін айтарлықтай төмендетеді, бұл хлор таблеткаларын жабық жерде сақтауға мүмкіндік береді. Экспресс-талдаудың индикаторлық тест-жолақтары жиынтығымен жабдықталған. Шығару нысаны: сыйымдылығы 1 килограмнан кем емес полимерлі банка (300-ден кем емес және банкадағы блистерлік қаптамадағы 305 таблеткадан артық емес).
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	595000000, Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Бескөл ауылы. ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Бескөл ауылы, Ипподромная, 1D
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған сәттен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	езинфекциялаушы құрал. Бұл құрал салмағы 3,14-тен кем емес және 3,5 грамнан аспайтын көпіршікті қаптамадағы таблеткалар. еріту кезінде кем дегенде 1,4 және 1,64 гр артық емес бөлетіндер. белсенді хлор. Құрал құрамында белсенді зат ретінде дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (Na-ДХИЦК тұзы) кемінде 84% мөлшерінде болады. Бір таблетканың ыдырауы кемінде 3,5 минут және 6,5 минуттан аспайды. Жұмыс ерітінділерінің жарамдылық мерзімі кемінде 6 тәулік. Асқазанға енгізген кезде құрал орташа қауіпті заттардың 3-ші класына, теріге қолданған кезде – қауіпті емес заттардың 4-ші класына жатады. Препарат грам-теріс және грам-позитивті бактерияларға (туберкулез микобактерияларын қоса алғанда), вирустарға (аденовирустарды, тұмау, парагрипп вирустарын және жіті респираторлық инфекциялардың басқа да қоздырғыштарын қоса алғанда, энтеровирустар, ротавирустар, Полиомиелит вирусы, энтеральді, парентеральді гепатиттер, герпес, ЖРВИ, "құс" вирустарына қарсы микробқа қарсы әсері бар тұмау, "шошқа" тұмауы, АИТВ және т. б.) және Кандида мен дерматофит тұқымдас саңырауқұлақтар; құрал аса қауіпті инфекциялардың қоздырғыштарына (оба, тырысқақ, туляремия, легионеллез) қатысты тиімді; құрал спороцидтік белсенділікке ие, оның ішінде сібір жарасы қоздырғыштарының спораларына қатысты; құрал референттік штаммға - Mycobacterium tuberculosis humanus h37rv режиміне ие, ол сынақтарды құжатпен жүргізуді растайды. Хлор таблеткаларын герметикалық тығыздалған пленкасы бар пластикалық банкаға салу керек, бұл хлордың улы иісін айтарлықтай төмендетеді, бұл хлор таблеткаларын жабық жерде сақтауға мүмкіндік береді. Экспресс-талдаудың индикаторлық тест-жолақтары жиынтығымен жабдықталған. Шығару нысаны: сыйымдылығы 1 килограмнан кем емес полимерлі банка (300-ден кем емес және банкадағы блистерлік қаптамадағы 305 таблеткадан артық емес).СТ РК 3752-2021

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18018603-1
Наименование закупки:	приобретение товаров на 2026 год
Номер лота:	№ 88764703-ЗЦП2
Наименование лота:	Средство дезинфицирующее
Описание лота:	на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислот
Дополнительное описание лота:	Средство дезинфицирующее-диохлор. Средство представляет собой таблетки в блистерной упаковке весом не менее 3,14 и не более 3,5 гр. выделяющие при растворении не менее 1,4 и не более 1,64 гр. активного хлора. Средство содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-соль ДХИЦК) в количестве не менее 84%. Распадаемость одной таблетки не менее 3,5 минут и не более 6,5 минут. Срок годности рабочих растворов не менее 6 суток. Средство при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу – к 4-му классу малоопасных веществ. Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, «птичьего» гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.) и грибов рода Кандида и дерматофитов; средство эффективно в отношении возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, легионеллез); средство обладает спороцидной активностью, в том числе в отношении спор возбудителей сибирской язвы; Средство имеет режим на референтный штамм - Mycobacterium tuberculosis humanus H37RV, подтверждающий документально проведением испытаний. Хлорные таблетки должны быть упакованы в пластиковую банку с герметично запаянной плёнкой, значительно снижающий токсичный запах хлора, что позволяет хранение хлорных таблеток в закрытых помещениях. Укомплектованы комплектом индикаторных тест-полосок экспресс-анализа. Форма выпуска: банка полимерная вместимостью не менее 1 килограмма (не менее 300 и не более 305 таблеток в блистерной упаковке в банке).
Количество:	10
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	595000000, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Ипподромная, 1Д
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Средство дезинфицирующее-диохлор. Средство представляет собой таблетки в блистерной упаковке весом не менее 3,14 и не более 3,5 гр. выделяющие при растворении не менее 1,4 и не более 1,64 гр. активного хлора. Средство содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-соль ДХИЦК) в количестве не менее 84%. Распадаемость одной таблетки не менее 3,5 минут и не более 6,5 минут. Срок годности рабочих растворов не менее 6 суток. Средство при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу – к 4-му классу малоопасных веществ. Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, «птичьего» гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.) и грибов рода Кандида и дерматофитов; средство эффективно в отношении возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, легионеллез); средство обладает спороцидной активностью, в том числе в отношении спор возбудителей сибирской язвы; Средство имеет режим на референтный штамм - Mycobacterium tuberculosis humanus H37RV, подтверждающий документально проведением испытаний. Хлорные таблетки должны быть упакованы в пластиковую банку с герметично запаянной плёнкой, значительно снижающий токсичный запах хлора, что позволяет хранение хлорных таблеток в закрытых помещениях. Укомплектованы комплектом индикаторных тест-полосок экспресс-анализа. Форма выпуска: банка полимерная вместимостью не менее 1 килограмма (не менее 300 и не более 305 таблеток в

	блистерной упаковке в банке). СТ РК 3752-2021