Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17554768-1
Сатып алудың атауы:	Дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87659015-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Йод
Лоттың сипаттауы:	ерітінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Йодтың спирт. ерітіндісі 5% 20 мл.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Республика көшесі, 94
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік. Йод, сыртқа қолдануға арналған 5% спирттік ерітінді, құтысы 25 мл. Құрамы: Белсенді зат: йод — 50 г, қосымша заттар: калий йодиді — 20 г, 95% этанол, тазартылған су — 1 литрге дейін тең мөлшерде. Дозасы: 0,05. Көрсетілімдері: Терінің қабыну және инфекциялық аурулары, сыдырылған жерлер, кесілген жаралар, микрожарақаттар, жаралар, қабыну инфильтраттары, жаралардың жиектерін өңдеу, инъекциялар, пункциялар, катетеризация жүргізер алдында теріні өңдеу. Мақсаты: Ұсақ кесілген жаралар, сыдырылған жерлер, тері инфекциялары, емдік процедуралар. Шығарылу түрі: Сыртқа қолдануға арналған ерітінді. Артық дозалануы: Буларын деммен жұтқан кезде — жоғарғы тыныс алу жолдарының зақымдануы (күйік, ларингобронхоспазм), концентрлі ерітінділерді ішке қабылдаған кезде — асқазан-ішек жолының ауыр күйіктері, гемолиз, гемоглобинурия дамуы мүмкін; өлімге әкелетін доза шамамен 3 г. Емі: асқазанды натрий тиосульфатының 0,5% ерітіндісімен шаяды, көктамыр ішіне 30% натрий тиосульфаты — 300 мл-ге дейін енгізіледі. Препараттың түрі: Дәрілік препарат. Өзара әрекеттесуі: Эфир майларымен, аммиак ерітінділерімен, ақ тұнба түзетін сынаппен фармацевтикалық тұрғыдан үйлеспейді (жарылғыш қоспа түзіледі). Сілтілі немесе қышқыл орта, майдың, іріңнің, қанның болуы антисептикалық белсенділігін төмендетеді. Ағзалар мен жүйелер: Тері. Айрықша нұсқаулар: Сары сынап майымен бір мезгілде қолданғанда күйдіргіш әсері бар сынап йодиді түзілуі мүмкін. Қарсы көрсетілімдері: Жоғары сезімталдық, тиреотоксикоз, герпетиформды дерматит. Сақтау шарттары: Жарықтан қорғалған жерде, 0 °С-тан төмен емес температурада сақтау керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Жағымсыз әсерлері: Терінің тітіркенуі, ауқымды жара беткейлеріне ұзақ уақыт қолданғанда — йодизм (ринит, есекжем, Квинке ісінуі, сілекей бөлінуінің жоғарылауы, жас ағу, безеу тәрізді бөртпе), аллергиялық реакциялар (терінің қышуы). Қолдану тәсілі және дозалары: Сыртқа қолданылады, зақымдалған және өңдеуге жататын тері бөліктерін майлайды. Фармакологиялық әсері: Антисептикалық дәрі. Негізгі әсер етуші зат — антисептикалық қасиеттері бар молекулалық йод. Терінің ауқымды беткейлеріне жағылған кезде йод резорбтивті әсер көрсетеді: зат алмасуға белсенді әсер етеді, тироксин синтезіне қатысады, протеолитикалық әсер көрсетеді. Грамоң флораға (әсіресе стрептококк пен ішек таяқшасына), сондай-ақ патогенді саңырауқұлақтар мен ашытқыларға бактерицидтік әсер етеді. Стафилококк төзімдірек флора болып табылады, алайда препаратты ұзақ қолданғанда 80% жағдайда ол жойылады. Көк ірің таяқшасы төзімді. Препараттың уыттылығы төмен. ГОСТ 17768-90.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17554768-1
Наименование закупки:	Государственные закупки медикаментов и медицинских изделий
Номер лота:	№ 87659015-ЗЦП1
Наименование лота:	Йод
Описание лота:	раствор
Дополнительное описание лота:	Йод р-р спирт. 5% 20мл
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы улица Республики, 94
Срок поставки:	Со дня получения заявки от Заказчика, в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация. Йод раствор д/нар. прим. спирт. 5% фл. 25 мл. Состав: Активное вещество: йод 50 г,вспомогательные вещества: калия йодид 20 г, этанол 95%, вода очищенная поровну до 1 л. Дозировка: 0.05. Показания: Воспалительные и инфекционные заболевания кожи, ссадины, порезы, микротравмы, раны, воспалительные инфильтраты, обработка краев ран, кожи перед проведением инъекций, пункций, катетеризации. Назначение: мелкие порезы,ссадины,инфекции кожи, лечебные процедуры Форма выпуска: раствор для наружного применения Передозировка: При вдыхании паров - поражение верхних дыхательных путей (ожог, ларингобронхоспазм), при попадании концентрированных растворов внутрь - тяжелые ожоги пищеварительного тракта, развитие гемолиза, гемоглобинурии, смертельная доза составляет около 3 г.Лечение: промывают желудок 0,5% раствором натрия тиосульфата, в/в вводится натрия тиосульфат 30% - до 300 мл. Тип препарата: лекарственный препарат Взаимодействие: Фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака, белой осадочной ртутью (образуется взрывчатая смесь). Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляет антисептическую активность. Органы и системы: кожа Особые указания: При совместном применении с желтой ртутной мазью возможно образование ртути йодида, обладающего прижигающим действием. Противопоказания: Гиперчувствительность, тиреотоксикоз, герпетиформный дерматит. Условия хранения: В защищенном от света месте, при температуре не ниже 0 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Побочные действия: Раздражение кожи, при длительном применении на обширных раневых поверхностях - йодизм (ринит, крапивница, отек Квинке, слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь), аллергические реакции (кожный зуд). Способ применения и дозы: Наружно, смазывают пораженные и подлежащие обработке участки кожи. Фармакологическое действие: Антисептическое средство. Основным действующим веществом является молекулярный йод, обладающий антисептическими свойствами. При нанесении на обширные поверхности кожи йод оказывает резорбтивное действие: активно влияет на обмен веществ, участвует в синтезе тироксина, обладает протеолитическим действием.Оказывает бактерицидное действие, как на грамположительную флору (активнее всего - на стрептококка и кишечную палочку), так и на патогенные грибки и дрожжи. Более упорной флорой является стафилококк, однако при длительном применении препарата в 80% случаев он исчезает. Синегнойная палочка устойчива. Препарат малотоксичен. ГОСТ 17768-90.