Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17556196-1
Сатып алудың атауы:	Дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87659056-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сусыз Кофеин, Парацетамол, фенилэфрин гидрохлориді, Хлорфенирамин малеаты
Лоттың сипаттауы:	таблеткалар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Грипго таблеткалары, №100
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Республика көшесі, 94
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік. Осы мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 12-бабы 5-тармағының 4) және 5) тармақшаларына сәйкес жүргізіледі. Грипго таблеткалары №100. Сипаттамасы: Ақ түсті, капсула тәрізді, екі жағы дөңес таблеткалар. Мәрмәр тәрізді түстің болуына жол беріледі. Шығарылу түрі: Таблеткалар. Белсенді заттар: Парацетамол, фенилэфрин, кофеин, хлорфенирамин. Құрамы: парацетамол, сусыз кофеин 30 мг, фенилэфрин гидрохлориді 10 мг, хлорфенирамин малеаты 2 мг, микрокристалды целлюлоза, кроскармеллоза натрийі, магний стеараты. Қолдану тәсілі және дозалары: Ересектерге және 12 жастан асқан балаларға тәулігіне 3–4 рет 1 таблеткадан тағайындалады, сумен ішу керек. Ең жоғары тәуліктік доза - 4 таблетка. Емдеу курсының ұзақтығы — 3–5 тәуліктен аспауы тиіс. Көрсетілген дозалардан асыруға болмайды. Көрсетілімдері: тұмау және дене қызуының көтерілуімен, бас және бұлшықет ауыруымен, мұрыннан су ағуымен, мұрынның бітелуі, түшкіру, жас ағу түріндегі аллергиялық компонентпен қатар жүретін басқа да жедел респираторлық вирустық инфекциялардың симптомдарын емдеу. Қарсы көрсетілімдері: препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық, трициклді антидепрессанттарды, МАО тежегіштерін, бета-адреноблокаторларды бір мезгілде қабылдау, құрамында парацетамол бар препараттарды бір мезгілде қабылдау, артериялық гипертензия, гипертиреоз, қуықасты безінің гипертрофиясы, созылмалы алкоголизм, бүйрек және бауыр аурулары, жүктілік және бала емізу кезеңі, 12 жасқа дейінгі балалар жасы. Жағымсыз әсерлері: тері бөртпесі, қышыну, есекжем, ангионевроздық ісіну, бас айналу, ұйықтап кетудің бұзылуы, жоғары қозғыштық, артериялық қысымның жоғарылауы, тахикардия, жүрек айнуы, құсу, эпигастрий аймағындағы ауырсыну, ауыздың құрғауы, несептің іркілуі, аккомодация парезі, көзішілік қысымның жоғарылауы, мидриаз, анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, гемолиздік анемия, апластикалық анемия, метгемоглобинемия, панцитопения, гепатоуытты әсер, нефроуыттылық (емізікше некрозы), бронх обструкциясы. Артық дозалануы: жүрек айнуы, құсу, ауыздың, мұрынның және тамақтың құрғауы, асқазан немесе бауыр аймағындағы ауырсыну, тершеңдік, тыныс алудың бұзылуы, сананың шатасуы, брадикардия, артериялық гипертензия, тахикардия, аритмия, беттің қызаруы. Ауыр жағдайларда бауыр жеткіліксіздігі және кома дамиды. Сақтау шарттары: Құрғақ, жарықтан қорғалған жерде, 25ºС-тан аспайтын температурада, сондай-ақ балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Ең төменгі жас: 12 жастан бастап. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Өлшем бірлігі: Қаптама.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17556196-1
Наименование закупки:	Государственные закупки медикаментов и медицинских изделий
Номер лота:	№ 87659056-ЗЦП1
Наименование лота:	Кофеин безводный, Парацетамол, Фенилэфрина гидрохлорид, Хлорфенирамина малеат
Описание лота:	таблетки
Дополнительное описание лота:	Таблетки Грипго №100
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы улица Республики, 94
Срок поставки:	Со дня получения заявки от Заказчика, в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Данная государственная закупка проводится в соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 5 статьи 12 Закона РК "О государственных закупках". Техническая спецификация. Таблетки Грипго №100. Описание: Двояковыпуклые таблетки капсулообразной формы белого цвета. Допускается мраморность. Форма выпуска: Таблетки. Активные вещества: Парацетамол, Фенилэфрин, Кофеин, Хлорфенирамин. Состав: парацетамол, кофеин безводный 30 мг, фенилэфрина гидрохлорид 10 мг, хлорфенирамина малеат 2 мг, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, магния стеарат. Способ применения и дозы: Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таблетке 3 – 4 раза в сутки, запивать водой. Максимальная суточная доза – 4 таблетки. Длительность курса лечения – не более 3 – 5 суток. Не рекомендуется превышать указанные дозы. Показания: лечение симптомов гриппа и других острых респираторных вирусных заболеваний, сопровождающиеся лихорадкой, головной и мышечной болью, насморком, аллергическим компонентом в виде заложенности носа, чихания, слезотечения. Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, одновременный прием трициклических антидепрессантов, ингибиторов МАО, бета-адреноблокаторов, одновременный прием препаратов, содержащих парацетамол, артериальная гипертензия, гипертиреоз, гипертрофия предстательной железы, хронический алкоголизм, заболевания почек и печени, беременность и период лактации, детский возраст до 12 лет. Побочные действия: кожная сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, головокружение, нарушение засыпания, повышенная возбудимость, повышение артериального давления, тахикардия, тошнота, рвота, эпигастральная боль, сухость во рту, задержка мочи, парез аккомодации, повышение внутриглазного давления, мидриаз, анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, апластическая анемия, метгемоглобинемия, панцитопения, гепатотоксическое действие, нефротоксичность (папиллярный некроз), бронхообструкция. Передозировка: тошнота, рвота, сухость во рту, носу и горле, боль в области желудка или печени, потливость, нарушение дыхания, спутанность сознания, брадикардия, артериальная гипертензия, тахикардия, аритмия, покраснение лица. В тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность и кома. Условия хранения Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25ºС, а также в недоступном для детей месте Минимальный возраст: от 12 лет. Срок годности: 3 года. Единица измерения: Упаковка.