Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17554768-1
Сатып алудың атауы:	Дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87659611-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Магний сульфаты
Лоттың сипаттауы:	ерітінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Магния сульфат 25% 5мл №10
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Республика, 94
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамасы. Осы мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 12-бабы 5-тармағының 4) және 5) тармақшаларына сәйкес жүргізіледі. Магний сульфатының 25% ерітіндісі, 5 мл №10, ампулалар. Сипаттамасы: Мөлдір, түссіз сұйықтық. Көлемі, мл: 5. Белсенді зат: Магний сульфаты. Құрамы: Қосымша зат — инъекцияға арналған су. Қолдану тәсілі және дозалары: Препаратты бұлшықет ішіне, көктамыр ішіне баяу немесе көктамырішілік инфузия түрінде тағайындайды. Жаңадан дайындалған инфузиялық ерітінділер ұзақ уақыт сақтауға жатпайды және дайындалғаннан кейін бірден қолданылуы тиіс. Енгізу жиілігі мен дозалары көрсетілімдерге және емдік әсеріне байланысты жеке белгіленеді. Инфузиялық енгізу кезінде препаратты натрий хлоридінің 0,9% ерітіндісімен немесе глюкозаның 5% ерітіндісімен сұйылтады. Көктамыр ішіне инъекция жасаған кезде енгізу жылдамдығы әдетте минутына 150 мг-нан (0,6 мл/мин) аспауы тиіс, аритмияны және жүкті әйелдердегі эклампсияны емдеу жағдайларын қоспағанда. Гипомагниемия: Орташа дәрежедегі гипомагниемия кезінде (0,5–0,7 ммоль/л) ересектерге әрбір 6 сағат сайын бұлшықет ішіне 4 мл (1 г магний сульфаты) енгізіледі. Қарсы көрсетілімдері: Препараттың компоненттеріне жеке жоғары сезімталдық; артериялық гипотензия; айқын брадикардия (ЖЖЖ минутына 55 соққыдан төмен); атриовентрикулярлық блокада; кальций тапшылығына және тыныс алу орталығының тежелуіне байланысты жағдайлар; тыныс алу ағзаларының ауыр аурулары; кахексия; бүйрек функциясының бұзылуы; айқын бауыр немесе бүйрек жеткіліксіздігі; миастения; қатерлі жаңа түзілімдер; босануға дейінгі кезең (босануға 2 сағат қалғанда); лактация кезеңі; етеккір кезеңі. Сақтау шарттары: Түпнұсқалық қаптамасында, 25 °С-тан аспайтын температурада сақтау керек. Мұздатуға болмайды. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! Қолдануға көрсетілімдері: Кешенді ем құрамында: гипертониялық криз; жүрек ырғағының қарыншалық бұзылыстары («пируэт» типті тахикардия); құрысу синдромы; эклампсия; гипомагниемия, магнийге қажеттіліктің жоғарылауы; ауыр металл тұздарымен, тетраэтилқорғасынмен, барийдің еритін тұздарымен улану кезінде (антидот ретінде) кешенді ем құрамында. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. Өлшем бірлігі: Дана.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17554768-1
Наименование закупки:	Государственные закупки медикаментов и медицинских изделий
Номер лота:	№ 87659611-ЗЦП1
Наименование лота:	Магния сульфат
Описание лота:	раствор
Дополнительное описание лота:	Магния сульфат 25% 5мл №10
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы Республика, 94
Срок поставки:	Со дня получения заявки от Заказчика, в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация. Данная государственная закупка проводится в соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 5 статьи 12 Закона РК "О государственных закупках". Раствор Магния Сульфат 25% 5 мл №10, ампулы. Описание: Прозрачная бесцветная жидкость. Объем, мл: 5. Активные вещества: Магния сульфат. Состав: вспомогательное вещество - вода для инъекций. Способ применения и дозы: Назначают внутримышечно, внутривенно медленно или в виде внутривенной инфузии. Свежеприготовленные инфузионные растворы не подлежат длительному хранению и должны быть использованы сразу после приготовления. Кратность введения и дозы индивидуальны в зависимости от показаний и терапевтического эффекта. При инфузионном введении препарат разводят 0,9 % раствором натрия хлорида или 5 % глюкозы. При внутривенной инъекции скорость введения обычно не должна превышать 150 мг/мин (0,6 мл/мин), за исключением лечения аритмий и эклампсии беременных. Гипомагниемия. При умеренно выраженной гипомагниемии (0,5-0,7 ммоль/л) вводят взрослым по 4 мл (1 г магния сульфата) внутримышечно каждые 6 часов. Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата - артериальная гипотензия, выраженная брадикардия (ЧСС меньше 55 уд/мин), атриовентрикулярная блокада - состояния, обусловленные дефицитом кальция и угнетением дыхательного центра, тяжелые заболевания органов дыхания - кахексия - нарушение функции почек, выраженная печеночная или почечная недостаточность - миастения - злокачественные новообразования - предродовый период (за 2 часа до родов), период лактации – менструация. Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте! Показания к применению: В составе комплексной терапии: - гипертонический криз, желудочковые нарушения ритма сердца (тахикардия типа «пируэт») - судорожный синдром - эклампсия - гипомагниемия, повышенная потребность в магнии - при отравлении солями тяжелых металлов, тетраэтилсвинцом, растворимыми солями бария (антидот) в комплексной терапии. Срок годности: 5 лет. Единица измерения: Штука.