Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17412014-1
Сатып алудың атауы:	Дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81408681-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Повидон-йод, аллантоин
Лоттың сипаттауы:	спрей
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Йокс-Тева» жергілікті қолдануға арналған спрей, 30 мл, №1
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Республика, 94
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының 12-бабы 5-тармағының 4) және 5) тармақшаларына сәйкес жүргізіледі. Йокс спрей д/жергілікті қолдануға фл. 30 мл №1 Шығарылу формасы: Спрей Дәрілік түрі: Дәрілік препарат Белсенді заттар: Аллантоин + Повидон-Йод Қолданылуы: Тонзиллит, Стоматит, Инфекциялық-қабыну аурулары ауыз қуысы мен жұтқыншақта, Афтозды жаралар, Ауыз қуысы жараларын емдеу, Глоссит, Ангина, Ауыз қуысы мен тамақтағы хирургиялық араласулардан кейінгі жағдайлар. Мүшелер мен жүйелер: Мұрын-жұтқыншақ, Ауыз қуысы Құрамы: Белсенді заттар: повидон-йод – 85 мг, аллантоин – 1 мг Қосымша заттар: левоментол – 0,3 г, лимон қышқылы моногидрат – 0,06 г, натрий цитрат дигидрат – 0,06 г, этанол 96% – 6 г, пропиленгликоль – 9 г, тазартылған су – 30 мл-ге дейін Қолдану әдісі мен дозасы: Препаратты күніне 2-4 рет, ауыз қуысы мен жұтқыншаққа бір рет оңға, бір рет солға бүркіп қолданады. Қажет болса, препаратты 4 сағат сайын жиі қолдануға болады. Қолданбас бұрын қорғаныс қақпағын шешіп, аппликаторды орнатады. 2-3 рет аппликаторды басып, ерітіндіні бүріккішке жеткізеді. Содан кейін аппликатор түтігін ауыз қуысына 2-3 см енгізіп, тынысты ұстап, қақпақты 2 рет басып, бір бүрікті оңға, екіншісін солға жасау керек. Аппликаторды қолданбас бұрын және кейін ыстық сумен жуады. Көрсеткіштер: Ауыз қуысы мен жұтқыншақтың инфекциялық-қабыну аурулары, соның ішінде ангина, тонзиллит, тонзилофарингит, глоссит, стоматит, афта, хирургиялық араласулардан кейінгі ауыз қуысы мен жұтқыншақты өңдеу, химиотерапия кезінде ауыз қуысы мен тамақ инфекцияларын емдеу, стрептококк ангиналарында антибиотиктермен бірге қосымша құрал ретінде қолдану. Қарсы көрсеткіштер: Қалқанша безінің қызметі бұзылған жағдайда (гипертиреоз), жүрек жеткіліксіздігі, Дюринг герпетиформды дерматиті, радиоактивті йодпен бір уақытта қолдану, 8 жасқа дейінгі балалар, жүкті және лактация кезеңі, йодқа немесе препараттың басқа компоненттеріне жоғары сезімталдық. Жанама әсерлері: Кейбір жағдайларда: препаратқа жоғары сезімталдық реакциялары, йодқа жергілікті аллергиялық реакциялар (қышу, гиперемия), препаратты тоқтатуды қажет етуі мүмкін. Ұзақ қолданғанда (7-10 күннен артық) йодизм белгілері пайда болуы мүмкін (ауызда металл дәмі, сілекей көп шығуы, көз, көмей ісінуі). Фармакологиялық әсері: Препарат ауыз қуысы аурулары мен ЛОР тәжірибесінде жергілікті қолдану үшін антимикробтық және қабынуға қарсы әсерге ие. Теріні жанасқанда йод бөлінеді. Антисептикалық және қабынуға қарсы әсері бар. Бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, простейшелерге қарсы кең спектрлі әсер көрсетеді. Артық дозалануы: Йокс препаратының артық дозалануы туралы мәліметтер берілмеген. Арнайы ескертулер: Науқасқа йодизм белгілері пайда болған жағдайда препаратты тоқтатып, дәрігерге қаралу қажеттігі туралы ескерту қажет. Препарат ішке қолдануға арналмаған, оны жұту немесе тыныстау ұсынылмайды. Өзара әрекеттесу: Йокс препараты мен ауыз қуысы мен жұтқыншаққа арналған басқа антисептикалық

	препараттарды, әсіресе сутек пероксиді барларын бір уақытта қолдану ұтымсыз, өйткені препарат белсенділігін жоғалтуы мүмкін. Сақтау шарттары: Балалардан қол жетпейтін, жарықтан қорғалған жерде 10°–25°C температурада сақтау қажет. Қолдану мерзімі – 4 жыл. Минималды жас: 8 жас және одан жоғары Өлшем бірлігі: дана.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17412014-1
Наименование закупки:	Государственные закупки медикаментов и медицинских изделий
Номер лота:	№ 81408681-ЗЦП1
Наименование лота:	Повидон-йод, аллантоин
Описание лота:	спрей
Дополнительное описание лота:	Йокс-Тева спрей д/местн. прим. фл. 30 мл №1
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы Республика, 94
Срок поставки:	Со дня получения заявки от Заказчика, в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Данная государственная закупка проводится в соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 5 статьи 12 Закона РК "О государственных закупках". Йокс спрей д/местн. прим. фл. 30 мл №1. Форма выпуска: Спрей; Тип препарата: Лекарственный препарат; Активные вещества: Аллантоин+Повидон-Йод; Назначение: Тонзиллит, Стоматит, Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, Афтозные изъязвления, Заживление ран в полости рта, Глоссит, Ангина, Состояние после хирургических вмешательств полости рта и горла. Органы и системы: Носоглотка, Ротовая полость. Состав: Действующее вещество: повидон-йод – 85 мг, аллантоин – 1 мг.Вспомогательные вещества: левоментол – 0.3 г, лимонной кислоты моногидрат – 0.06 г, натрия цитрат дигидрат – 0.06 г, этанол 96% – 6 г, пропиленгликоль – 9 г, вода очищенная – до 30 мл. Способ применения и дозы: Препарат применяют 2-4 раза/сут, по одному впрыскиванию направо и налево в полость рта и глотки. При необходимости препарат можно применять более часто, через каждые 4 ч.Перед применением следует снять защитный колпачок и установить аппликатор. Нажать 2-3 раза на аппликатор, чтобы раствор поступил в распылитель и после нажима разбрызгивался. После этого поместить трубку аппликатора на 2-3 см в полость рта, задержать дыхание и нажать 2 раза на колпачок так, чтобы одно орошение было сделано направо, а второе - налево. Аппликатор до и после применения промывают горячей водой. Показания: инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, в т.ч. ангины, тонзиллиты, тонзилофарингиты, глосситы, стоматиты, афты, для обработки полости рта и глотки при хирургических вмешательствах на дыхательных путях и полости рта и в послеоперационном периоде, для лечения инфекций полости рта и горла, возникающих при химиотерапии, при стрептококковых ангинах применяется как дополнительное средство при лечении антибиотиками. Противопоказания: нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз), сердечная недостаточность, герпетиформный дерматит Дюринга, одновременное применение радиоактивного йода, детский возраст до 8 лет, беременность, период лактации (грудного вскармливания), повышенная чувствительность к йоду и к другим компонентам препарата. Побочные действия: В отдельных случаях: реакции повышенной чувствительности к препарату, местные проявления аллергической реакции на йод (зуд, гиперемия), что может потребовать отмены препарата.При длительном применении (более 7-10 дней) возможны явления йодизма (в т.ч. металлический вкус во рту, повышенное слюнотечение, отеки глаз, гортани). Фармакологическое действие: Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения при заболеваниях полости рта и в ЛОР-практике. При контакте с кожей выделяет йод. Оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. Обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении бактерий, вирусов, грибов, простейших. Передозировка: Данные о передозировке препарат Йокс не предоставлены. Особые указания:

	Пациент должен быть предупрежден о необходимости прекратить прием препарата и обратиться к врачу при появлении признаков йодизма. Препарат не предназначен для приема внутрь, его не следует вдыхать или проглатывать. Взаимодействие: Нецелесообразно одновременное применение препарата Йокс с другими антисептическими средствами для местного применения в полости рта и глотки, особенно содержащие перекись водорода, в связи с инактивацией препарата. Условия хранения: Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 10° до 25°С. Срок годности - 4 года. Минимальный возраст: От 8 лет. Единица измерения: Штука.