

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862125-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық шығын материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 88392678-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тест-экспресс
Лоттың сипаттауы:	простатаерекше антигенді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АЛАТ 12011. Сұйық-УФ тесті — қан сарысуы мен плазмасындағы аланинаминотрансфераза (АЛАТ) белсенділігін анықтауға арналған «GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV Humazym Test» реагенттер жинағы. Қаптамасы: 10 × 10 мл-ден аспайды. R1 — 1-реагент, ферменттік реагент ТРИС буфері (pH 7,5) — 100 ммоль/л. L-аланин — 500 ммоль/л. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 1200 Е/л-ден жоғары. R2 — 2-реагент, бастапқы реагент 2-оксоглутарат — 15 ммоль/л. NADH — 0,18 ммоль/л. Зерттелетін үлгілер Қан сарысуы немесе гепаринмен не ЭДТА-мен өңделген плазма. Гемолизге жол бермеу керек! Белсенділіктің 3 күн ішіндегі төмендеуі: +4 °С температурада — шамамен 10%. +20-25 °С температурада — 17%. Өлшеу шарттары Толқын ұзындығы: Hg 365 нм, 340 нм немесе Hg 334 нм. Оптикалық жол ұзындығы: 1 см. Температура: 25 °С, 30 °С немесе 37 °С. Өлшеу әдісі: ауаға (немесе дистилденген суға) қатысты өлшеу; реакция барысында оптикалық тығыздық төмендейді. Есептеу Оптикалық тығыздықтың минутына өзгерісін (dA/мин) есептеу үшін келесі мәндер қолданылады: Hg 365 нм кезінде — 0,06-0,08. Hg 334 нм немесе 340 нм кезінде — 0,12-0,16. (1 + 2 процедуралары). Тек алғашқы 2 минуттағы өлшеу нәтижелерін пайдалану қажет: 1 минут инкубация және 2 минут өлшеу.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Татибеков көшесі, 54
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша жылдың соңына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АЛАТ 12011. Сұйық-УФ тесті — қан сарысуы мен плазмасындағы аланинаминотрансфераза (АЛАТ) белсенділігін анықтауға арналған «GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV Humazym Test» реагенттер жинағы. Қаптамасы: 10 × 10 мл-ден аспайды. R1 — 1-реагент, ферменттік реагент ТРИС буфері (pH 7,5) — 100 ммоль/л. L-аланин — 500 ммоль/л. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 1200 Е/л-ден жоғары. R2 — 2-реагент, бастапқы реагент 2-оксоглутарат — 15 ммоль/л. NADH — 0,18 ммоль/л. Зерттелетін үлгілер Қан сарысуы немесе гепаринмен не ЭДТА-мен өңделген плазма. Гемолизге жол бермеу керек! Белсенділіктің 3 күн ішіндегі төмендеуі: +4 °С температурада — шамамен 10%. +20-25 °С температурада — 17%. Өлшеу шарттары Толқын ұзындығы: Hg 365 нм, 340 нм немесе Hg 334 нм. Оптикалық жол ұзындығы: 1 см. Температура: 25 °С, 30 °С немесе 37 °С. Өлшеу әдісі: ауаға (немесе дистилденген суға) қатысты өлшеу; реакция барысында оптикалық тығыздық төмендейді. Есептеу Оптикалық тығыздықтың минутына өзгерісін (dA/мин) есептеу үшін келесі мәндер қолданылады: Hg 365 нм кезінде — 0,06-0,08. Hg 334 нм немесе 340 нм кезінде — 0,12-0,16. (1 + 2 процедуралары). Тек алғашқы 2 минуттағы өлшеу нәтижелерін пайдалану қажет: 1 минут инкубация және 2 минут өлшеу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862125-1
Наименование закупки:	Лабораторные расходные материалы
Номер лота:	№ 88392678-ЗЦП1
Наименование лота:	Тест-экспресс
Описание лота:	для определения простатаспецифического антигена
Дополнительное описание лота:	АЛАТ 12011. Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови «GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV Humazym Test», фасовка 10x10ml не более ,R1 - Реагент 1, ферментативный реагент ТРИС буфер (pH 7,5)-100 ммоль/л L-аланин- 500 ммоль/л. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) > 1200 Е/л R2 - Реагент 2, стартовый реагент 2-оксоглурат 15 ммоль/л NADH 0.18 ммоль/л. Пробы. Сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА плазма. Не допускать гемолиза! Потеря активности за 3 дня составляет: при +4оС ~ 10%, при 20-25оС - 17% Условия измерения. Длина волны Hg 365 нм, 340нм или Hg 334 нм Оптический путь 1 см Температура 25оС, 30оС или 37оС. Измерение: Против воздуха (или дист.воды), реакция с уменьшением оптической плотности ВычислениеДля вычисления изменение опт. плотности за 1 минуту (dA/мин) в пределах 0.06-0.08 (Hg 365 нм) или 0.12-0.16 (Hg 334 нм, 340 нм) (процедуры 1+2), используйте только результаты измерения первых 2 минут (1 минута инкубации, 2 минуты измерения).
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район улица Татибекова, 54
Срок поставки:	По заказу заказчика до конца года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	АЛАТ 12011. Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови «GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV Humazym Test», фасовка 10x10ml не более ,R1 - Реагент 1, ферментативный реагент ТРИС буфер (pH 7,5)-100 ммоль/л L-аланин- 500 ммоль/л. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1200 Е/л R2 - Реагент 2, стартовый реагент 2-оксоглурат 15 ммоль/л NADH 0.18 ммоль/л. Пробы. Сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА плазма. Не допускать гемолиза! Потеря активности за 3 дня составляет: при +4оС ~ 10%, при 20-25оС - 17% Условия измерения. Длина волны Hg 365 нм, 340нм или Hg 334 нм Оптический путь 1 см Температура 25оС, 30оС или 37оС. Измерение: Против воздуха (или дист.воды), реакция с уменьшением оптической плотности ВычислениеДля вычисления изменение опт. плотности за 1 минуту (dA/мин) в пределах 0.06-0.08 (Hg 365 нм) или 0.12-0.16 (Hg 334 нм, 340 нм) (процедуры 1+2), используйте только результаты измерения первых 2 минут (1 минута инкубации, 2 минуты измерения).