

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762129-1
Сатып алудың атауы:	Дәрі дәрмектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87967388-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Интерферон адамдық рекомбинантты альфа-2, димедрол, бор қышқылы
Лоттың сипаттауы:	тамшылар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дифенгидрамин 10 ампул Инъекциялық ерітінді Белсенді ингредиенттер Дифенгидрамин Қолдану көрсеткіштері Аллергиялық ринит, аллергиялық конъюнктивит, анафилактикалық шок, ұйқысыздық Мүшелер мен жүйелер Тері, мұрын қуысы Құрамы Белсенді ингредиент: дифенгидрамин гидрохлориді (дифенгидрамин) - 10 мг; Қосымша зат: инъекцияға арналған су - 1 мл дейін. Мөлшерлеу және енгізу Қолдану тәсілі: көктамыр ішіне немесе бұлшықет ішіне. Ересектер мен 14 жастан асқан балаларға көктамыр ішіне немесе бұлшықет ішіне енгізу: күніне 1-3 рет 1-5 мл 10 мг/мл ерітінді (10-50 мг); ең жоғары тәуліктік доза: 200 мг. 7 айдан 12 айға дейінгі балалар үшін: 0,3-0,5 мл (3-5 мг); 1-3 жас: 0,5-1 мл (5-10 мг); 4-6 жас: 1-1,5 мл (10-15 мг); 7-14 жас: қажет болған жағдайда әр 6-8 сағат сайын 1,5-3 мл (15-30 мг). Қолдану көрсеткіштері Аллергиялық реакциялар (есекжем, шөп безгегі, ангиоэдема), аллергиялық конъюнктивит, вазомоторлы ринит, геморрагиялық васкулит, сарысу ауруы, қышыну дерматоздары, ұйқының бұзылуы (монотерапия немесе ұйықтататын дәрілермен бірге), хорея, теңіз ауруы, ауа ауруы, жүкті әйелдердің құсуы, Меньер синдромы, премедикация. Ең төменгі жас 7 айдан бастап Жарамдылық мерзімі 12 ай, қараңғы жерде, 25°С аспайтын температурада. Дозалау 10
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы Әбдірахманова көшесі 39А
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде келісім шарт жасақталғаннан кейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Димедрол 10 ампул Инъекциялық ерітінді Белсенді ингредиенттер Дифенгидрамин Қолдану көрсеткіштері Аллергиялық ринит, аллергиялық конъюнктивит, анафилактикалық шок, ұйқысыздық Мүшелер мен жүйелер Тері, мұрын қуысы Құрамы Белсенді ингредиент: дифенгидрамин гидрохлориді (дифенгидрамин) - 10 мг; Қосымша зат: инъекцияға арналған су - 1 мл дейін. Мөлшерлеу және енгізу Қолдану тәсілі: көктамыр ішіне немесе бұлшықет ішіне. Ересектер мен 14 жастан асқан балаларға көктамыр ішіне немесе бұлшықет ішіне енгізу: күніне 1-3 рет 1-5 мл 10 мг/мл ерітінді (10-50 мг); ең жоғары тәуліктік доза: 200 мг. 7 айдан 12 айға дейінгі балалар үшін: 0,3-0,5 мл (3-5 мг); 1-3 жас: 0,5-1 мл (5-10 мг); 4-6 жас: 1-1,5 мл (10-15 мг); 7-14 жас: қажет болған жағдайда әр 6-8 сағат сайын 1,5-3 мл (15-30 мг). Қолдану көрсеткіштері Аллергиялық реакциялар (есекжем, шөп безгегі, ангиоэдема), аллергиялық конъюнктивит, вазомоторлы ринит, геморрагиялық васкулит, сарысу ауруы, қышыну дерматоздары, ұйқының бұзылуы (монотерапия немесе ұйықтататын дәрілермен бірге), хорея, теңіз ауруы, ауа ауруы, жүкті әйелдердің құсуы, Меньер синдромы, премедикация. Ең төменгі жас 7 айдан бастап Жарамдылық мерзімі 12 ай, қараңғы жерде, 25°С аспайтын температурада. Дозалау 10

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762129-1
Наименование закупки:	Приобретение лекарственных средств
Номер лота:	№ 87967388-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2, димедрол, борная кислота
Описание лота:	капли
Дополнительное описание лота:	Димедрол 10 ампул Раствор для инъекций Активные вещества Дифенгидрамин Назначение Аллергический ринит, Аллергический конъюнктивит, Анафилактический шок, Бессонница Органы и системы Кожа, Носовая полость Состав Активное вещество: дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) - 10 мг; Вспомогательное вещество; вода для инъекций - до 1 мл. Способ применения и дозы Способ применения: внутривенно или внутримышечно. Для взрослых и детей старше 14 лет внутривенно или внутримышечно 1 - 5 мл раствора 10 мг/мл (10-50 мг) 1 - 3 раза в день; максимальная суточная доза - 200 мг. Для детей в возрасте от 7 месяцев до 12 месяцев по 0,3 - 0,5 мл (3 - 5 мг), от 1 года 3 лет по 0,5 - 1 мл (5 - 10 мг), от 4 до 6 лет по 1 - 1,5 мл (10 - 15 мг), от 7 до 14 лет по 1,5 - 3 мл (15 - 30 мг) при необходимости каждые 6-8 часов. Показания Аллергические реакции (крапивница, сенная лихорадка, ангионевротический отек), аллергический конъюнктивит, вазомоторный ринит, геморрагический васкулит, сывороточная болезнь, зудящие дерматозы, нарушения сна (монотерапия или в комбинации со снотворными), хорея, морская и воздушная болезнь, рвота беременных, синдром Меньера, премедикация. Минимальный возраст От 7 месяцев Срок годности 12 мес., в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Дозировка 10
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау город Атырау улица Абдрахманова 39А
Срок поставки:	в течение 20-ти календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Димедрол 10 ампул Раствор для инъекций Активные вещества Дифенгидрамин Назначение Аллергический ринит, Аллергический конъюнктивит, Анафилактический шок, Бессонница Органы и системы Кожа, Носовая полость Состав Активное вещество: дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) - 10 мг; Вспомогательное вещество; вода для инъекций - до 1 мл. Способ применения и дозы Способ применения: внутривенно или внутримышечно. Для взрослых и детей старше 14 лет внутривенно или внутримышечно 1 - 5 мл раствора 10 мг/мл (10-50 мг) 1 - 3 раза в день; максимальная суточная доза - 200 мг. Для детей в возрасте от 7 месяцев до 12 месяцев по 0,3 - 0,5 мл (3 - 5 мг), от 1 года 3 лет по 0,5 - 1 мл (5 - 10 мг), от 4 до 6 лет по 1 - 1,5 мл (10 - 15 мг), от 7 до 14 лет по 1,5 - 3 мл (15 - 30 мг) при необходимости каждые 6-8 часов. Показания Аллергические реакции (крапивница, сенная лихорадка, ангионевротический отек), аллергический конъюнктивит, вазомоторный ринит, геморрагический васкулит, сывороточная болезнь, зудящие дерматозы, нарушения сна (монотерапия или в комбинации со снотворными), хорея, морская и воздушная болезнь, рвота беременных, синдром Меньера, премедикация. Минимальный возраст От 7 месяцев Срок годности 12 мес., в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Дозировка 10